化学療法レジメン一覧

	療法名	使用薬剤	投与量		単位	点滴	投与時間	投与間隔	追加薬品	注意事項
胃癌	weekly PTX	タキソール注（パクリタキセル）	80	mg/	m2	生食500ml	3hr	週1回 3投1休		タキソール注（パクリタキセル）iv後のアレルギー反応
	Biweekly CPT-11	トポテシン注	150	mg/	m2	5%gl250ml	1.5hr	隔週毎に2～3回 3W		
	アブラキサン	アブラキサン	220	mg/	m2	生食100ml	30min	3週毎		ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ100mg当たり生食20mlで溶解。残りの生食廃棄
	S-1+CDDP	ランダ注	60	mg/	m2	生食500ml	2hr	Day 1投与5週毎		
	SOX	エルプラット注射用	100	mg/	m2	5%gl250ml	2hr	3週毎	TS-1	(day1-14)
	RAM+PTX	サイラムザ点滴静注	8	mg/	kg	生食250ml	1hr	隔週		
		パクリタキセル注	80	mg/	m2	生食250ml	1hr			
	TS-1+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ	ハーセプチン（初回）	8	mg/	kg	生食250ml	1.5hr	3週毎	TS-1	(day1-14)
		ハーセプチン（2回目以降）	6	mg/	kg	生食250ml	1.5hr	3週毎	TS-1	(day1-14)
	Tmab+SOX	ハーセプチン(初回)	8	mg/	kg	生食250ml	1.5hr	3週毎	S-1	day1～14
		ハーセプチン（2回目以降）	6	mg/	kg	生食250ml	1.5hr			
		オキサリプラチン	100	mg/	m2	5%gl250ml	2hr			
	weekly PTX	タキソール注（パクリタキセル）	80	mg/	m2	生食500ml	3hr	週1回 3投2休		パクリタキセルiv後のアレルギー反応
	RAM+nab-PTX	サイラムザ点滴静注	8	mg/	kg	生食250ml	1hr	4週毎		ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ100mg当たり生食20mlで溶解。残りの生食廃棄　側管から
		アブラキサン	100	mg/	m2	生食100ml	30min			
	S-1+DTX	ドセタキセル点滴静注	40	mg/	m2	生食250ml	1hr	Day 1投与3週毎	TS-1	1ｺｰｽ目S-1単独、2～7コース目S-1+DTX、8ｺｰｽ目以降S-1単独
	nivolumab	オプジーボ	240	mg/	body	生食100ml	1hr	隔週		
	Ramucirumab	サイラムザ点滴静注	8	mg/	kg	生食250ml	30min	2週毎		
	nivolumab+mFOLFOX6	オプジーボ	240	mg/	body	生食100ml	1hr	隔週		
		オキサリプラチン	85	mg/	m2	5%gl250ml	2hr			
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/	m2	生食500ml	2hr			
		フルオロウラシル	400	mg/	m2	生食20ml	5min			
		フルオロウラシル	2400	mg/	m2	5%gl250ml	終了直後46h			
	nivolumab+SOX	オプジーボ	360	mg/	body	生食100ml	30min	3週毎	S-1	day1～14
		オキサリプラチン	130	mg/	m2	5%gl500ml	2hr			

	療法名	使用薬剤	投与量		単位	点滴	投与時間	投与間隔	追加薬品	注意事項
乳癌	weekly PTX	タキソール注（パクリタキセル）	80	mg/	m2	生食500ml	3hr	週1回 3投1休		タキソール注（パクリタキセル）iv後のアレルギー反応
	Biweekly CPT-11	トポテシン注	150	mg/	m2	5%gl250ml	1.5hr	隔週毎に2～3回 3W		
	FEC100	注射用エンドキサン	500	mg/	m2	生食100ml	30min	3週毎		
		ファルモルビシン注	100	mg/	m2	生食100ml	30min			
		5-FU注250協和	500	mg/	m2	生食100ml	30min			
	DTX	タキソテール注（ドセタキセル水和物）	40	mg/	body	5%gl250ml	1hr	週1回 2投		
	Her/PTX	ハーセプチン(初回)	4	mg/	kg	生食250ml	1.5hr	週1回 2～3投　2休		
		ハーセプチン（2回目以降）	2	mg/	kg	生食250ml	1.5hr			
		タキソール注（パクリタキセル）	80	mg/	m2	生食500ml	2hr			
	アブラキサン	アブラキサン	220	mg/	m2	生食100ml	30min	3週毎		ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ100mg当たり生食20mlで溶解。残りの生食廃棄
	ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ単独療法	ハーセプチン（初回）	8	mg/	kg	生食250ml	1.5hr	3週毎		
		ハーセプチン（2回目以降）	6	mg/	kg	生食250ml	1.5hr	3週毎		
	ハラヴェン	ハラヴェン	1.4	mg/	m2	生食50ml	5min	週1回 2投1休		
	PTX+Bev	パクリタキセル注	90	mg/	m2	生食250ml	1hr	パクリタキセルは3投1休、アバスチンは隔		
		アバスチン注	10	mg/	kg	生食100ml	1hr			
	T-DM1	カドサイラ点滴静注	3.6	mg/	kg	生食250ml	30min	3週毎		
	PER/HER/DTX	パージェタ	840	mg/	body	5%gl250ml	1hr	3週毎		
		トラスツズマブ（初回）	8	mg/	kg	生食250ml	1.5hr			
		トラスツズマブ（2回目以降）	6	mg/	kg	生食250ml	1.5hr			
		ドセタキセル点滴静注	75	mg/	m2	5%gl250ml	1hr			

	dose-dene EC	エピルビシン注	100	mg/	m2	生食100ml	30min	隔週		
		注射用エンドキサン	500	mg/	m2	生食100ml	30min			
		ｼﾞｰﾗｽﾀ皮下注	3.6	mg/	body					
	dose-dene PAC	パクリタキセル注	175	mg/	m2	5%gl500ml	3hr	隔週		
		ｼﾞｰﾗｽﾀ皮下注	3.6	mg/	body					
	PER/Her（初回）	パージェタ	840	mg/	body	生食250ml	1hr	3週毎		
		トラズツズマブ（初回）	8	mg/	kg	生食250ml	1.5hr			
	PER/Her	パージェタ	840	mg/	body	生食250ml	1hr	3週毎		
		トラズツズマブ（2回目以降）	6	mg/	kg	生食250ml	1.5hr			
	trastuzumab+eribulin（初回）	ハラヴェン	1.4	mg/	body	生食50ml	1hr	3週毎		
		トラズツズマブ（初回）	8	mg/	kg	生食250ml	1.5hr			
	trastuzumab+eribulin	ハラヴェン	840	mg/	body	生食50ml	1hr	3週毎		
		トラズツズマブ（2回目以降）	6	mg/	kg	生食250ml	1.5hr			
	trastuzumab+capecitabine	トラズツズマブ（初回）	8	mg/	kg	生食250ml	1.5hr	3週毎		1000mg/m2/回 2週間内服後 1週間休薬
		トラズツズマブ（2回目以降）	6	mg/	kg	生食250ml	1.5hr	3週毎		
	療法名	使用薬剤	投与量		単位	点滴	投与時間	投与間隔	追加薬品	注意事項
	IRIS/Bev	アバスチン注	5	mg/	kg	生食250ml	1.5hr	隔週	TS-1	80mg/body 2週間内服後 2週間休薬
		トポテシン注	100	mg/	m2	5%gl500ml	1.5hr			
	セツキシマブ単独療法	アービタックス注射液(初回)	400	mg/	m2	生食250ml	1終了30分後	毎週1回		
		アービタックス注射液(2回目以降)	250	mg/	m2	生食250ml	1終了30分後			
	ERB+CPT-11	アービタックス注射液(初回)	400	mg/	m2	生食250ml	2hr	Day1,8,15,22,29,36,43 週1回 (Day1-49まで1コー		生食とアービタックスは全量で250mlとする。
		アービタックス注射液(2回目以降)	250	mg/	m2	生食250ml	2hr			
		トポテシン注	150	mg/	m2	生食250ml	2hr	Day 1,15,29 (Day1-49ま		
	P-mab+CPT-11	ベクティビックス点滴静注	6	mg/	kg	生食100ml	1hr	隔週		
		イリノテカン	150	mg/	m2	5%gl250ml	1.5hr			
	ベクティビックス単独	ベクティビックス点滴静注	6	mg/	kg	生食100ml	1hr	2週毎		
	m-FOLFOX6	エルプラット注射用	85	mg/	m2	5%gl250ml	2hr	2週間毎		
		アイソボリン注	200	mg/	m2	5%gl250ml	2hr			
		5-FU注250協和	400	mg/	m2	生食20ml	静注			
		5-FU注250協和	2400	mg/	m2	5%gl250ml	46h持続			全量250ml
	Bev+mFOLFOX6	アバスチン注	5	mg/	kg	生食500ml	1hr	隔週		
		オキサリプラチン	85	mg/	m2	5%gl250ml	2hr			
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/	m2	生食500ml	2hr			
		フルオロウラシル	400	mg/	m2	生食20ml	5min			
		フルオロウラシル	2400	mg/	m2	5%gl250ml	終了直後46h			
	P-mab+mFOLFOX6	ベクティビックス点滴静注	6	mg/	kg	生食100ml	1hr	2週毎		
		オキサリプラチン	85	mg/	m2	5%gl250ml	2hr			
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/	m2	生食500ml	2hr			
		フルオロウラシル	400	mg/	m2	生食20ml	5min			
		フルオロウラシル	2400	mg/	m2	5%gl500ml	終了直後46h			
	ERB+mFOLFOX6(初回)〔day1〕	アービタックス注射液(初回)	400	mg/	kg	生食500ml	1hr	隔週		
		オキサリプラチン	85	mg/	m2	5%gl250ml	2hr			
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/	m2	生食500ml	2hr			
		フルオロウラシル	400	mg/	m2	生食20ml	5min			
		フルオロウラシル	2400	mg/	m2	5%gl250ml	終了直後46h			
	ERB+mFOLFOX6〔day1〕	アービタックス注射液(2回目以降)	250	mg/	kg	生食500ml	1hr	隔週		
		オキサリプラチン	85	mg/	m2	5%gl250ml	2hr			
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/	m2	生食500ml	2hr			
		フルオロウラシル	400	mg/	m2	生食20ml	5min			
		フルオロウラシル	2400	mg/	m2	5%gl250ml	終了直後46h			
	ERB+mFOLFOX6〔day8〕	アービタックス注射液(2回目以降)	250	mg/	m2	生食250ml	1hr	隔週		

大腸癌	FOLFIRI	トポテシン注	150	mg/	m2	5%gl250ml	2hr	2週毎			
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/	m2	生食500ml	2hr				
		5-FU注250協和	400	mg/	m2	生食20ml	5min				
		5-FU注250協和	2400	mg/	m2	5%gl500ml	終了直後46h				
	Bev+FOLFIRI	アバスチン注	5	mg/	kg	生食100ml	1.5hr	2週間毎			
		トポテシン注	150	mg/	m2	生食250ml	2hr				
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/	m2	生食250ml	2hr				
		5-FU注250協和	400	mg/	m2	生食20ml	3.4終了直後				
		5-FU注250協和	2400	mg/	m2	生食250ml	終了直後46h				
	P-mab+FOLFIRI	ベクティビックス点滴静注	6	mg/	kg	生食100ml	1hr	2週毎			
		トポテシン注	150	mg/	m2	5%gl250ml	2hr				
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/	m2	生食500ml	2hr				
		5-FU注250協和	400	mg/	m2	生食20ml	5min				
		5-FU注250協和	2400	mg/	m2	5%gl500ml	終了直後46h				
	ERB+FOLFIRI(初回)〔day1〕	アービタックス注射液(初回)	400	mg/	kg	生食500ml	1hr	隔週			
		トポテシン注	150	mg/	m2	5%gl250ml	2hr				
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/	m2	生食500ml	2hr				
		5-FU注250協和	400	mg/	m2	生食20ml	5min				
		5-FU注250協和	2400	mg/	m2	5%gl500ml	終了直後46h				
	ERB+FOLFIRI(初回)〔day8〕	アービタックス注射液(2回目以降)	250	mg/	m2	生食250ml	1hr	隔週			
	ERB+FOLFIRI(day1)	アービタックス注射液(2回目以降)	250	mg/	kg	生食500ml	1hr	隔週			
		トポテシン注	150	mg/	m2	5%gl250ml	2hr				
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/	m2	生食500ml	2hr				
		5-FU注250協和	400	mg/	m2	生食20ml	5min				
		5-FU注250協和	2400	mg/	m2	5%gl500ml	終了直後46h				
	ERB+FOLFIRI(day8)	アービタックス注射液(2回目以降)	250	mg/	m2	生食250ml	1hr	隔週			
	RAM+FOLFIRI	サイラムザ点滴静注	8	mg/	kg	生食250ml	1hr	隔週			
		イリノテカン	150	mg/	m2	5%gl250ml	2hr				
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/	m2	生食500ml	2hr				
		フルオロウラシル	400	mg/	m2	生食20ml	5min				
		フルオロウラシル	2400	mg/	m2	5%gl250ml	終了直後46h				
	AFL+FOLFIRI	ザルトラップ点滴静注	4	mg/	kg	生食100ml	1hr	隔週			
		イリノテカン	150	mg/	m2	5%gl250ml	2hr				
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/	m2	生食500ml	2hr				
		フルオロウラシル	400	mg/	m2	生食20ml	5min				
		フルオロウラシル	2400	mg/	m2	5%gl250ml	終了直後46h				
	FOLFIRINOX	エルプラット注射用	85	mg/	m2	5%gl250ml	2hr	2週毎			
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/	m2	生食500ml	2hr				
		トポテシン注	150	mg/	m2	5%gl250ml	2hr				
		5-FU注250協和	400	mg/	m2	生食20ml	5min				
		5-FU注250協和	2400	mg/	m2	5%gl500ml	終了直後46h				
	SOX	オキサリプラチン	130	mg/	m2	5%gl250ml	2hr	3週毎	TS-1	(day1-14)	
	Bev+SOX	アバスチン注	7.5	mg/	kg	生食100ml	初回1.5hr	3週毎	S-1	day1～14	
		オキサリプラチン	130	mg/	m2	5%gl250ml	2hr				
	XELOX	エルプラット注射用	130	mg/	m2	5%gl250ml	2hr	3週毎			
	Bev+XELOX	アバスチン注	7.5	mg/	kg	生食100ml	初回1.5hr	3週毎	ｾﾞﾛｰﾀﾞ	1000mg/m2/回 2週間内服後 1週間休薬	
		オキサリプラチン	130	mg/	m2	5%gl250ml	2hr				
	Bev+ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ･ﾁﾋﾟﾗｼﾙ塩酸塩	アバスチン注	5	mg/	kg	生食100ml	初回1.5hr	4週毎	ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ･ﾁﾋﾟﾗｼﾙ	(day1-5、8-12)	
	ペムブロリズマブ	キイトルーダ	200	mg/	body	生食100ml	30min	3週毎			
	pertuzumab+tmab（初回）	パージェタ	840	mg/	body	生食250ml	1hr	3週毎			
		トラズツズマブ（初回）	8	mg/	kg	生食250ml	1.5hr				
	pertuzumab+tmab	パージェタ	840	mg/	body	生食250ml	1hr	3週毎			

	pertuzumab+trtab	トラズツズマブ(2回目以降)	6	mg/	kg	生食250ml	1.5hr	3週毎		
	療法名	使用薬剤	投与量		単位	点滴	投与時間	投与間隔	追加薬品	注意事項
膵・胆道癌	GEM	ジェムザール注射用	1000	mg/	m2	生食100ml	1hr	週1回 3投1休		
	Biweekly GEM	ジェムザール注射用	1000	mg/		生食100ml	1hr	隔週		
	GEM+S-1	ジェムザール注射用	1000	mg/	m2	生食100ml	30min	隔週 2週休薬	TS-1	80mg/m2 (day1-15)
	GEM+アブラキサン	アブラキサン	125	mg/	m2	生食100ml	30min	週1回 3投1休		
		ゲムシタビン	1000	mg/	m2	生食100ml	30min			
	GEMOX	オキサリプラチン	85	mg/	m2	5%gl250ml	2hr	隔週		
		ゲムシタビン	1000	mg/	m2	生食100ml	30min			
	GC	ランダ注	25	mg/	m2	生食500ml	2hr	週1回3投1休		
		ゲムシタビン	1000	mg/	m2	生食100ml	30min			
	GEM+Erlotinib	ゲムシタビン	1000	mg/	m2	生食100ml	30min	4週毎	タルセバ	(day1-28)
	療法名	使用薬剤	投与量		単位	点滴	投与時間	投与間隔	追加薬品	注意事項
食道癌	weekly PTX	パクリタキセル注	100	mg/	m2	5%gl250ml	2hr	週1回 6投2休		パクリタキセルiv後のアレルギー反応
	biweekly DCF	フルオロウラシル	800	mg/	m2	ﾌｨｼﾞｵ140 500ml	24hr	4週毎(ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙのみday1～5、15)		
		ドセタキセル点滴静注	30	mg/	m2	生食250ml	1hr			
		ランダ注	80	mg/	m2	生食500ml	2hr			
	nivolumab	オプジーボ	240	mg/	body	生食100ml	1hr	隔週		
	FP	5-FU注250協和	800	mg/	m2	生食500ml	24hr	Day 1投与4週毎		
		ランダ注	80	mg/	m2	生食500ml	2hr			
	DTX	タキソテール注(ドセタキセル水和物)	40	mg/	body	5%gl250ml	1hr	週1回 2投		
	Pembrolizumab+FP	キイトルーダ	200	mg/	body	生食100ml	30min	Day 1投与3週毎		
		フルオロウラシル	800	mg/	m2	生食500ml	24hr	Day 1～5投与 3週毎		
		シスプラチン	80	mg/	m2	生食500ml	2hr	Day 1投与3週毎		
	療法名	使用薬剤	投与量		単位	点滴	投与時間	投与間隔	追加薬品	注意事項
悪性神経膠腫	BV10	アバスチン注	10	mg/	kg	生食100ml	1.5hr	隔週		
	Bev+TMZ	アバスチン注	10	mg/	kg	生食100ml	1.5hr	隔週	TMZ	day1～5
	Bev15+TMZ	アバスチン注	15	mg/	kg	生食100ml	1.5hr	4週毎	TMZ	day1～5
	療法名	使用薬剤	投与量		単位	点滴	投与時間	投与間隔	追加薬品	注意事項
腎癌	nivolumab	オプジーボ	240	mg/	body	生食100ml	1hr	隔週		
	Ave+アキシチニブ	バベンチオ	10	mg/	kg	生食250ml	1hr	隔週	アキシチニブ	day1～14
	Pembroアキシチニブ	キイトルーダ	200	mg/	body	生食100ml	30min	Day 1投与3週毎	アキシチニブ	day1～21
	療法名	使用薬剤	投与量		単位	点滴	投与時間	投与間隔	追加薬品	注意事項
膀胱・尿管癌	GC	ゲムシタビン	1000	mg/	m2	生食100ml	30min	Day 1、2,8,15投与4週毎		
		ランダ注	70	mg/	m2	生食500ml	2hr			
	CaG療法	ゲムシタビン	1000	mg/	m2	生食100ml	30min	週1回 3投1休		
		カルボプラチン注	5		AUC	生食500ml	2hr			
	ペムブロリズマブ	キイトルーダ	200	mg/	body	生食100ml	30min	3週毎		
	療法名	使用薬剤	投与量		単位	点滴	投与時間	投与間隔	追加薬品	注意事項
前立腺癌	DP療法	ドセタキセル点滴静注	75	mg/	body	生食250ml	1hr	3週毎		
	Cabazitaxel+PSL	ジェブタナ点滴静注	25	mg/	m2	生食250ml	1hr	3週毎	PSL10mg	